

راهنمای نحوه تزریق با سرنگ آماده تزریق الدیکسیا®

شرایط مناسب نگهداری

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
- دارو را در یخچال در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت کنید. سرنگ را گرم نکنید.
- به منظور محافظت از دارو در برابر نور، سرنگ را درون بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- از تکان دادن سرنگ خودداری کنید.




- در صورت شکستگی یا ترک برداشتن سرنگ، از دارو استفاده نکنید.
- هر سرنگ الدیکسیا® برای یک بار تزریق قابل استفاده است و پس از استفاده، باید آن را دور انداخت.
- دارو را پس از گذشتن تاریخ انقضا (درج شده روی سرنگ یا جعبه دارو) استفاده نکنید.
- در صورت مشاهده کدورت، تغییر رنگ یا ذرات بزرگ در محتویات داخل سرنگ، از آن استفاده نکنید.

مهم: در صورت صلاح دید و تصمیم پزشک، شما یا یکی از اطرافیان می توانید تزریق داروی الدیکسیا® را در خانه انجام دهید؛ اما باید قبل از اقدام به تزریق، نحوه درست آماده سازی و تزریق الدیکسیا® را آموزش ببینید.

آماده سازی قبل از تزریق




- سرنگ از پیش پرشده را بدون اینکه از جعبه اصلی دارو بیرون آورید، از یخچال خارج کنید و ۳۰ دقیقه روی سطح صافی قرار دهید تا با محیط هم دما شود.



- دست های خود را با صابون و آب گرم بشویید.

انتخاب و آماده سازی محل تزریق



- نواحی مناسب برای تزریق داروی الدیکسیا® به صورت زیرجلدی عبارت اند از:

سطح رویی ران (از ۵ سانتی متر پایین تر از کشاله ران تا ۵ سانتی متر بالاتر از زانو)، شکم (با فاصله ۵ سانتی متری از ناف) و یک سوم میانی بخش پشتی و خارجی بازو (چنانچه تزریق توسط فرد دیگری انجام می شود).

- در هر بار تزریق، بخش متفاوتی از نواحی ذکر شده را برای تزریق انتخاب کنید.
- دارو نباید در محلی که پوست کبود، قرمز، سفت، دردناک، دارای زخم یا هر ضایعه دیگری است تزریق شود.
- لازم است محل تزریق شما، با محل تزریق قبلی حدود ۲/۵ سانتی متر فاصله داشته باشد.

- اجازه دهید الکل با جریان هوا خشک شود.
- از فوت کردن محل تزریق خودداری نمایید.



- محل تزریق را با پنبه الکی به صورت دورانی از مرکز به خارج ضد عفونی کنید.



- سرنگ را از جعبه خارج و محتویات داخل سرنگ را بررسی کنید.

- در صورت مشاهده کدورت، تغییر رنگ یا ذرات بزرگ در محتویات داخل سرنگ، از مصرف دارو اجتناب کنید.
- ممکن است یک یا چند حباب هوا در سرنگ مشاهده کنید که طبیعی است.
- در صورت شکستگی، ترک برداشتن سرنگ یا باز بودن درپوش سوزن، از دارو استفاده نکنید.

مراحل تزریق



- با یک دست سرنگ را نگه دارید و با دست دیگر، درپوش سوزن را خارج کنید.

- مشاهده قطره ای از دارو روی سوزن طبیعی است.
- از گذاشتن دوباره درپوش روی سوزن خودداری کنید، ممکن است باعث آسیب به سوزن شود.
- پس از جدا کردن درپوش، از لمس یا تماس سوزن با سطوح خودداری کنید.

۷ با یک دست سرنگ را همانند قلم در دست بگیرید و با دست دیگر برآمدگی کوچکی را در محل تزریق ایجاد کنید.



۸ سوزن را با زاویه ۴۵ تا ۹۰ درجه با یک حرکت سریع، وارد مرکز برآمدگی کنید.



۹ برآمدگی ایجاد کرده را رها کنید. سپس با دست آزاد شده بدنه سرنگ را نگه دارید.



۱۰ با دست دیگر خود، پیستون سرنگ را به آرامی تا انتها فشار دهید تا تمام دارو تزریق شود.



۱۱ پس از پایان تزریق، سوزن را به آرامی و با همان زاویه از پوست خارج کنید.



- هنگام خارج کردن سوزن از پوست، ممکن است مختصری خون یا دارو از محل تزریق خارج شود. پوست محل تزریق را به آرامی با پنبه خشک یا گاز فشار دهید تا زمانی که خونریزی متوقف شود.
- از ماساژ دادن محل تزریق خودداری کنید.
- تزریق زیرجلدی ممکن است باعث درد زودگذر یا کبودی خفیف در ناحیه تزریق شود. برای کنترل این علائم، می‌توان از کمپرس سرد قبل و بعد از تزریق استفاده کرد.

۱۲ بلافاصله پس از تزریق، سرنگ را در سطل مخصوص اشیای تیز و برنده بیندازید. از دور انداختن سرنگ در سطل زباله خانگی بپرهیزید.



نکته:

به یاد داشته باشید سرنگ آماده تزریق به منظور تزریق راحت توسط خودتان طراحی شده است؛ اما در ابتدا، آموزش‌های لازم را از پزشک، داروساز یا پرستار خود درخواست کنید. همچنین می‌توانید برای دریافت آموزش رایگان تزریق به یکی از مراکز ارکیدلایف مراجعه فرمایید.

به هیچ عنوان بدون مشورت با پزشک و به‌طور ناگهانی داروی خود را قطع نکنید. در صورتی‌که به هر دلیل تزریق با موفقیت انجام نشد، در اسرع وقت با پزشک، داروساز یا ارکیدلایف با شماره ۰۲۱-۴۲۵۹۳ تماس حاصل فرمایید.