


 شرکت سیناژن
CinnaGen



- 

- 



- ۱ قلم را از یخچال خارج کرده و مدتی صبر کنید تا با محیط هم‌دم شود.



- ۳ قلم را با یک دست نگه دارید و درپوش قلم را با دست دیگر بردارید.



- یک سوزن جدید برداشته و پس از جدا کردن برجسب، ابتدا آن را به طور مستقیم و بدون چرخش وارد محل اتصال سوزن در قلم کنید و سپس **در جهت عقربه‌های ساعت** بچرخانید تا در جای خود محکم شود.



- درپوش داخلی سوزن را با احتیاط برداشته و دور بیندازید. قلم را به گونه ای نگه دارید که سر سوزن به سمت بالا باشد.

۹ به آرامی به محفظه حاوی دارو ضربه بزنید تا حباب‌های هوا به سمت بالا حرکت کنند. ممکن است بعضی حباب‌های کوچک در محفظه باقی بمانند.




۱۰ دکمه‌ی تزریق قلم را با انگشت شست فشار دهید تا عدد ۰ (صفر)، در پنجره نمایشگر درجه در مقابل نشانگر قرار گیرد. در این مرحله خروج یک قطره مایع را از سوزن خواهید دید. اگر هیچ قطره‌ای مشاهده نکردید، مراحل ۸ تا ۱۰ را تکرار کنید. شما می‌توانید این مراحل را حداکثر ۴ بار تکرار کنید.

• در صورتی که همچنان هیچ قطره‌ای خارج نشد، سوزن را تعویض و مراحل ۸ تا ۱۰ را یک بار دیگر تکرار کنید. اگر با تعویض سوزن مشکل برطرف نشد، با مرکز حمایت از بیمار ارکیدلایف تماس بگیرید. هیچگاه قبل از نصب سوزن، دکمه آبی رنگ را فشار ندهید.



۱۱ بهترین نواحی برای تزریق عبارتند از:
ران: سطح رویی ران از ۵ سانتی‌متر پایین‌تر از کشاله ران تا ۵ سانتی‌متر بالاتر از زانو
شکم: با فاصله ۵ سانتی‌متری از ناف
بازو: یک سوم میانی بخش پشتی و خارجی بازو
• بهتر است در هر بار تزریق بخش متفاوتی را انتخاب کنید و دارو همواره در نقاط یکسانی تزریق نشود.
• بر روی ترک‌های پوستی، جای زخم و محل کبودی تزریق نکنید.



۱۲ پیچ تنظیم‌کننده درجه را بچرخانید تا عدد توصیه شده توسط پزشک یا داروساز، در پنجره نمایشگر درجه در مقابل نشانگر ظاهر شود.

• از پیچاندن بیش از حد و غیر ضروری پیچ تنظیم‌کننده درجه، جداً اجتناب کنید. این امر ممکن است باعث عدم عملکرد مناسب قلم شود. اگر پیچ تنظیم‌کننده درجه را بیش از دوز مورد نظر بچرخانید، برای تصحیح دوز و برگشت به مقدار مورد نیاز، آن را در خلاف جهت اولیه بچرخانید. زمانی که داروی موجود در قلم رو به اتمام باشد، شما نمی‌توانید پیچ تنظیم‌کننده درجه را بیش از مقدار موجود در آن بچرخانید.



۱۴ قلم را با یک دست گرفته و با دست دیگر برآمدگی کوچکی در محل مورد نظر برای تزریق ایجاد کنید.



۱۳ سطح مورد نیاز از پوست را با پد الکلی ضد عفونی کنید.



۱۶ دکمه‌ی تزریق را با انگشت شست به طور کامل به پایین فشار دهید تا عدد ۰ (صفر) در پنجره نمایشگر درجه در مقابل نشانگر ظاهر شود. دکمه آبی رنگ را از زمانی که عدد ۰ (صفر) در مقابل نشانگر در پنجره نمایشگر درجه ظاهر شد به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته و سپس سوزن را از پوست خارج نمایید. پس از تزریق محل تزریق را با پنبه خشک بپوشانید.

• خروج مختصری خون یا دارو از محل تزریق نگران‌کننده نیست. هیچگاه همه داروی موجود در قلم را بدون تجویز پزشک در یک نوبت تزریق نکنید.



۱۵ قلم را با زاویه ۹۰ درجه در مرکز برآمدگی قرار داده و سوزن را تا انتها وارد پوست نمایید.

مراحل پس از تزریق



۱۸ سرپوش محافظ را روی قلم بگذارید. قلم را جهت استفاده‌های بعدی در بسته‌بندی اصلی خود قرار داده و در محل مناسب نگهداری کنید. این دارو را می‌توان پس از اولین استفاده به مدت ۳۰ روز در یخچال (دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد) یا خارج از یخچال (دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد) نگهداری کرد.



۱۷ بلافاصله پس از هر بار تزریق سوزن را از قلم جدا کنید. برای این کار درپوش خارجی را با احتیاط روی سوزن قرار دهید. سپس آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا از جای خود خارج شود. سوزن را به همراه درپوش خارجی دور بیندازید.